

Xyloneural-Ampullen. Xyloneural-Durchstechflasche. Zusammensetzung: 1 ml Injektionslösung enthält als Wirkstoff 10 mg Lidocainhydrochlorid. Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydroxid (zur pH-Wert Einstellung), Wasser für Injektionszwecke, bei Durchstechflaschen zusätzlich 1 mg/ml Hydroxybenzoesäuremethylester (Konservierungsmittel). **Anwendungsgebiete:** Xyloneural eignet sich für die Anwendungsverfahren der Neuraltherapie. Die Anwendung sollte nur durch Ärzte erfolgen, die in diesen Verfahren entsprechend ausgebildet sind. **Erkrankungen der Wirbelsäule:** HWS-Syndrom, BWS-Syndrom, LWS-Syndrom, Lumbago, Ischialgie. **Erkrankungen der Extremitäten:** Schulter-Arm-Syndrom; Epikondylitis, Koxarthrose, Gonarthrose. **Beschwerden im Kopf- bzw. HNO-Bereich:** Kopfschmerzen verschiedener Genese, bei Migräne als Adjuvans, Tinnitus. **Andere Anwendungen der Neuraltherapie:** Psychovegetative Organbeschwerden (z.B. Reizblase), Tendomyopathien (z.B. Fibromyalgie, Myogelosen); Triggerpunktbehandlungen, Neuritiden, Neuralgien als Adjuvans, Narbenschmerzen. **Therapieformen:** Injektion am Locus dolendi (Lokaltherapie); Segmenttherapie: Segmentale Behandlung über das zugehörige Metamer (Dermatom, Myotom u.a.). Xyloneural eignet sich für Verfahren der Störfeldsuche und -therapie (z.B. über Narben, Zähne, Tonsillen); Probatorische und therapeutische Injektion an das Störfeld. **Gegenanzeigen:** Xyloneural darf nicht angewendet werden bei: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile (bei Allergie gegen p-Hydroxybenzoesäureester sind Xyloneural-Ampullen zu verwenden, da diese im Gegensatz zu den Xyloneural-Durchstechflaschen kein Konservierungsmittel enthalten), Überempfindlichkeit gegenüber anderen Lokalanästhetika vom Amid-Typ, hochgradigen Formen von Bradykardie, AV-Block II. und III. Grades und anderen Überleitungsstörungen, manifester Herzmuskelsuffizienz, schwerer Hypotonie, kardiogenem oder hypovolämischem Schock. Weitere Gegenanzeigen für die lokalanästhetische Anwendung von Lidocain, auch wenn Xyloneural dafür nicht vorgesehen ist: Parazervikalblockade in der Geburtshilfe, in der Geburtshilfe dürfen Xyloneural-Durchstechflaschen wegen des Konservierungsmittels nicht angewendet werden, bei einer drohenden oder bereits bestehenden Blutung ist die Epiduralanästhesie mit Lidocain kontraindiziert. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Lokalanästhetika, Amide. **ATC-Code:** N01BB02. **Abgabe:** Rezept- und apothekenpflichtig. **Packungsgrößen:** 5 bzw. 50 Ampullen zu 5 ml, 1 Durchstechflasche zu 50 ml. **Kassenstatus:** 5 Ampullen: Green Box, 50 Ampullen: No Box, Durchstechflaschen: No Box. **Zulassungsinhaber:** Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn. **Stand der Fachkurzinformation:** Oktober 2009. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.


Gratanforderung für Neuraltherapie-Karteikarten und Neuraltherapie-Anamnesebögen:

Sekretariat der ÖNR, A-6391 Fieberbrunn, Bahnhofbichl 13
Tel.: 05354 521 20, Fax: 05354 5300 731, E-Mail: oenr@tirol.com

Fachbereich Neuraltherapie



Therapierelevante Zonen und störfeldverdächtige Areale



GPB-XN 100101

>>> Diagnose

Neuraltherapie – Anamnesebogen

Name	Geburtsdatum	Sozialvers. Nr.
------	--------------	-----------------

Grund der Konsultation

	Schmerzen:
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	Schmerzverlauf:
	<input type="checkbox"/> dauernd <input type="checkbox"/> intermittierend
	Phasendauer <input style="width: 50px;" type="text"/>
	Intervalldauer <input style="width: 50px;" type="text"/>

Vorerkrankungen

Familiäre Disposition/Krankheiten in der Kindheit

Medikamenten-Anamnese

Regionenbezogene Anamnese

				wann	Operation	wann																																				
HNO-Region																																										
ZMK-Region					<table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td></td> </tr> </table>	R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L		8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L																									
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8																										
Thorax																																										
Abdomen																																										
Urogenital-region w ♀	Menses	Geburten	Ab./Interr.																																							
Urogenital-region m ♂	Miktion	Potenz																																								
Psychosozial																																										
CAVE				<input type="checkbox"/> Allergie <input type="checkbox"/> Leberfunktionsstörungen <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
				<input type="checkbox"/> Kard. Dekomp. <input type="checkbox"/> Störung d. Blutgerinnung <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				

HWS	Normalwert	Aktuell
Rotation	80-0-80	
Anteflex./Retroflex.	40-0-40	
Seitneigung	40-0-40	
Rot. in Anteflex.	40-0-40	
Rot. in Retroflex.	40-0-40	

Schulter	Normalwert	Aktuell
Außen-/Innenrot.	60-0-95	
Ext./Flex.	40-0-170	
Abd./Add.	180-0-40	


Ellbogen	Normalwert	Aktuell
Ext./Flex.	10-0-150	
Pron./Sup.	80-0-80	

Hüftgelenk	Normalwert	Aktuell
Außen-/Innenrot.	40-0-50	
Ext./Flex.	15-0-130	
Abd./Add.	40-0-30	

Knie	Normalwert	Aktuell
Ext./Flex.	5-0-130	

WS	Normalwert	Aktuell
Seitneigung	40-0-40	
Seitdrehung	30-0-30	

Finger-Boden-Abstand: _____



Gelenksschema nach Jansen

- 1=Ruheschmerz
- 2=Schwellung
- 3=Schmerz + Schwellung
- 4=Schmerz + Schwellung + Rötung
- 5=Bewegungsschmerz
- 6=Druckschmerz
- 7=Krepitieren
- 8=Operation/Versteifung

Schulter	Normalwert	Aktuell
Außen-/Innenrot.	60-0-95	
Ext./Flex.	40-0-170	
Abd./Add.	180-0-40	

Ellbogen	Normalwert	Aktuell
Ext./Flex.	10-0-150	
Pron./Sup.	80-0-80	

Hüftgelenk	Normalwert	Aktuell
Außen-/Innenrot.	40-0-50	
Ext./Flex.	15-0-130	
Abd./Add.	40-0-30	

Knie	Normalwert	Aktuell
Ext./Flex.	5-0-130	



Schmerztherapie mit

Xyloneural®

... zum Quaddeln und Infiltrieren